

## C1 機率

選擇題：(每題 2.5 分)

1 (3) 令  $A, B, C$  為三個事件， $A$  和  $B$  事件相互獨立， $B$  和  $C$  是互斥事件，

$P(A)=0.25, P(A \cap B)=0.2, P(C)=0.5$ ，求  $P[(A \cap B)^c \cup C]=?$

- (1) 0.458 (2) 0.75 (3) 0.8 (4) 0.958

2 (3) 若  $A$  與  $B$  獨立，且  $P(A)=0.5$ ， $P(A^c \cup B^c)=0.8$ ，則  $P(B)$  為何？

- (1) 0.2 (2) 0.3 (3) 0.4 (4) 0.5

3 (1) 假設某保險一年內可能發生理賠的件數為  $0, 1, 2, 3, \dots$ 。若發生  $i$  個理賠件數的機率為發

生  $i+1$  個理賠件數機率的 2 倍，且沒發生理賠事件的機率為  $\frac{1}{2}$ 。試問一年內發生理賠件

數至少 5 件的機率為何？

- (1)  $\frac{1}{32}$  (2)  $\frac{1}{64}$  (3)  $\frac{1}{128}$  (4)  $\frac{1}{256}$

4 (4) 投擲兩個均勻的六面骰子，直到這兩個骰子出現點數和大於 9 的次數發生 12 次為止。

令  $X$  為此隨機實驗終止時需要投擲兩個骰子出現點數和小於或等於 9 的次數，試問下列何者為  $X$  的偏度係數(coefficient of skewness)？

- (1) 0.5984 (2) 0.6336 (3) 0.7217 (4) 0.8250

5 (4) 由一副撲克中抽取三張牌，一張一張抽，且抽出不放回。請問第三張牌為「紅色牌」的機率為何？

- (1) 0.2 (2) 0.25 (3) 0.3 (4) 0.5

6 (3) A、B 二人相約於 9:30 見面，A 騎摩托車、B 搭乘公共運輸工具，假設估算 A 到達的時間為 9:20-9:40 之間，B 到達的時間為 9:15-9:45 之間，若兩人到達時間在估算區間內為均勻分配(uniform distribution)，請問 A 先到達的機率為若干？

- (1)  $\frac{1}{4}$  (2)  $\frac{1}{3}$  (3)  $\frac{1}{2}$  (4)  $\frac{2}{3}$

7 (1) 三 C 產品銷售時有一定的保證維修期間，銷售人員會同時推銷此產品的「延長維修合約」。若  $X$  表某三 C 經銷商一天筆記型電腦的銷售數， $Y$  表示筆記型電腦延長維修合約的銷售數，所以  $X \geq Y$ 。若  $X, Y$  聯合機率函數(joint probability function)可以表示為

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{34} (x+1)(3-x)(y+1)(2-y),$$

請問一天筆記型電腦的銷售數的最大值及最小值為若干？

- (1) 最大值 2，最小值 0    (2) 最大值 3，最小值 1  
 (3) 最大值 2，最小值 1    (4) 最大值 3，最小值 0

8 (1) 若某測驗有 100 題選擇題，答對 60 題及格，每一題有四個選項之單選題。某位同學每一題都用猜的，請問該生及格的機率？(四捨五入，取小數點四位)

- (1) 0.0000    (2) 0.0100    (3) 0.0010    (4) 0.1000

9 (4) 令  $Y_1, Y_2, Y_3$  為  $X_1, X_2, X_3$  的順序統計量(order statistics)。 $X_1, X_2, X_3$  則為獨立，且相同分配之指數隨機變數，其共同之機率密度函數為

$$f(x) = \beta e^{-\beta x}, \quad 0 < x < \infty.$$

令  $W_1 = 3Y_1, W_2 = 2(Y_2 - Y_1), W_3 = Y_3 - Y_2$ ，下列敘述何者為正確？

- a.  $W_1, W_2, W_3$  都是指數分配。  
 b.  $W_1, W_2, W_3$  為獨立且有相同分配之隨機變數  
 c.  $2\beta(W_1 + W_2 + W_3)$  為自由度 6 之卡方(Chi-square)分配  
 (1) a, b    (2) b, c    (3) a, c    (4) a, b, c

10 (3) 若某保單在五大都會區一年發生理賠的件數分別為獨立的卜瓦松(Poisson)分配隨機變數  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ ，且各都會區一年平均發生理賠的件數分別為

$$\mu_i = 5 \times i + 65.$$

下列何者為這五大都會區總共一年發生理賠件數超過 380 件的機率？

- (1) 0.7823    (2) 0.7910    (3) 0.8365    (4) 0.8925

11 (3) 有一保險之理賠服從一個卜瓦松過程(Poisson process)，平均一個月的理賠率是 100，假設理賠次數和理賠金額相互獨立，其中理賠金額有 2% 超過 30,000。求要經過連續幾個月的觀察期，至少有 90% 的機率會有至少三件理賠超過 30,000？

- (1) 1    (2) 2    (3) 3    (4) 4

12 (2) 下列敘述何者正確？

- a. 若  $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}$ ，則  $A$  與  $B$  不可能互斥(disjoint)。  
 b. 設  $P(A)P(B) \neq 0$ ，且  $A$  與  $B$  為兩互斥事件，則  $A$  與  $B$  不可能獨立(independent)。  
 c. 若  $P(A) = P(B)$ ，則  $A = B$ 。  
 (1) b    (2) a, b    (3) b, c    (4) a, b, c

13 (4) 若隨機變數  $X$  的動差生成函數為

$$M_X(t) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4-t}$$

試問  $P(X \leq 4)$  為何？

- (1)  $1 - \frac{3}{4}e^{-2}$     (2)  $1 - \frac{3}{4}e^{-4}$     (3)  $1 - \frac{1}{4}e^{-8}$     (4)  $1 - \frac{1}{4}e^{-16}$

14 (2) 令  $X$  為某保單一年發生之理賠金額。若  $X$  之機率密度函數(p.d.f.)為

$$f_X(x) = \frac{\alpha\theta^\alpha}{(x+\theta)^{\alpha+1}}, x \geq 0, \alpha > 0, \theta > 0$$

若理賠金額之第 20 百分位數為  $\theta - k$ ，而第 90 百分位數為  $3\theta - 2k$ ，試問  $\alpha$  的值為何？

- (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

15 (2) 假設天竺鼠的壽命為指數分配(exponential distribution)，公老鼠平均壽命為 4 年，母老鼠為 5 年。今有公老鼠、母老鼠各一隻於同一天出生，若兩隻老鼠的壽命為獨立，請問母老鼠先死亡的機率為何？

- (1)  $\frac{3}{9}$  (2)  $\frac{4}{9}$  (3)  $\frac{5}{9}$  (4)  $\frac{6}{9}$

16 (3) 已知隨機變數  $X$  之累積機率分配(cumulative distribution function)如下：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{50}, & 0 \leq x < 5 \\ 0.8, & 5 \leq x < 10 \\ 1, & x \geq 10 \end{cases}$$

求 32 百分位數 (32<sup>nd</sup> percentile)(計算至小數點第二位，四捨五入)

- (1) 3 (2) 3.5 (3) 4 (4) 4.5

17 (2) 令  $X$  是在區間  $(1, a)$  之間的均勻分配 (Uniform distribution)  $a > 1$ 。若已知  $E(X)=6$   $\text{Var}(X)$ ，求  $a = ?$

- (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 7

18 (4) 令  $X$  服從卜瓦松(Poisson)分配，平均數為  $\lambda$ 。試求

$$E(X(X-1)(X-2)\dots(X-9)) = ?$$

- (1) 1 (2)  $\lambda$  (3)  $\lambda(\lambda-1)\dots(\lambda-9)$  (4)  $\lambda^{10}$

19 (4) 一保險損失分配如下

損失金額(\$)	損失次數	損失總金額(\$)
<b>0-99</b>	500	25,000
<b>100-249</b>	450	90,000
<b>250-499</b>	350	125,000
<b>500-999</b>	200	150,000
<b>1000 以上</b>	100	200,000
<b>總和</b>	1600	590,000

當給付上限(limit)是 \$500 時，求降低成本比率(Percentage reduction in loss cost)?

- (1) 34% (2) 55% (3) 60% (4) 66%

20( ) 有兩個隨機變數  $X$  和  $Y$ ，給定

$$E(X) = 3, Var(X) = 2, E(Y | X = x) = x, Var(Y | X = x) = x^3$$

求  $Var(Y)$

- (1) 2 (2) 4 (3) 11 (4) 13 【原題出錯】

21(4) 下列敘述何者正確?

- a. 二項分配的均數必大於或等於變異數。
- b. 負二項分配的均數必小於或等於變異數。
- c. 在某參數值時，指數分配與卡方(Chi-square)分配為相同之分配。
- d. 指數分配也是伽瑪(gamma)分配。

- (1) d (2) a, b (3) a, b, c (4) a, b, c, d

22(1) 令  $f_{X,Y}(x,y) = e^{-(x+y)}$ ,  $0 < x < \infty$ ,  $0 < y < \infty$ 。試問  $P(X < Y | X < 2Y)$  為何?

- (1)  $\frac{3}{4}$  (2)  $e^{-1}$  (3)  $\frac{1}{2}e^{-1}$  (4)  $\frac{3}{4}e^{-1}$

23(2)  $X_1, X_2$  為兩個獨立的常態分配  $N(\mu = 1, \sigma^2 = 1)$ ,  $Z_1, Z_2$  為另兩個獨立的標準常態分配

$N(0, 1)$ ，且  $X$  與  $Z$  皆互相獨立。下列敘述何者為正確?

- a.  $\frac{Z_1 - Z_2}{\sqrt{(Z_1 - Z_2)^2}}$  為自由度 1 之 t 分配。
- b.  $[(X_1 - X_2)^2 + (Z_1 - Z_2)^2 + (Z_1 + Z_2)^2]/2$  為自由度 3 的卡方(Chi-square)分配。
- c.  $\frac{2(X_1 - X_2)^2}{(Z_1 - Z_2)^2 + (Z_1 + Z_2)^2}$  為 F 分配。

- (1) a, b (2) b, c (3) a, c (4) a, b, c

24(1) 假設某種遊戲贏的機率為 0.4，輸的機率為 0.5，不贏不輸(平手)的機率為 0.1。若此遊戲贏可以賺 10 元，輸則賠 10 元，平手 0 元。試問玩此遊戲者，每玩一次預期贏的金額為若干?

- (1) -1 (2) 0 (3) 0.5 (4) 1

25(2) 假設某種遊戲贏的機率為 0.4，輸的機率為 0.5，不贏不輸(平手)的機率為 0.1。若此遊戲贏可以賺 10 元，輸則賠 10 元，平手 0 元。試問玩此遊戲 100 次者，100 次合計不賠錢的機率為若干?

- (1) 0.0011 (2) 0.1446 (3) 0.5000 (4) 0.8554

26(1) 若連續型隨機變數  $X$  之機率密度函數為

$$f_X(x) = \frac{2|x|}{5}, -1 < x < 2,$$

求  $E(X)$

- (1) 0.93 (2) 1.00 (3) 1.09 (4) 1.20

27 (4) 若隨機變數  $X$  與  $Y$  之相關係數為  $\rho_{X,Y} = 0.53$ ，請問  $Y$  與  $X$  之相關係數為  $\rho_{Y,X}$  若干？

- (1) -0.53 (2) -0.47 (3) 0.47 (4) 0.53

28 (3) 假設產險公司整理某一年期險種的理賠經驗，公司認為申請理賠的客戶中「一年之總理賠次數」與「一年總理賠金額」的分配可表示於下表：

機率分配		一年之總理賠金額(萬元)			
		(0, 2]	(2, 5]	(5, 10]	合計
一年之總理 賠次數	1	20%	40%	30%	90%
	2	1%	1%	5%	7%
	3	0.5%	0.5%	1%	2%
	4	0%	0.2%	0.8%	1%
	合計	21.5%	41.7%	36.8%	100%

請問一年總理賠金額的中位數為何？(以萬元計算，四捨五入)

- (1) 2 萬 (2) 3 萬 (3) 4 萬 (4) 5 萬

29 (1) 某保險一年總理賠的金額為  $S_N = X_1 + X_2 + \dots + X_N$ ，其中  $N$  為一年所發生理賠的件數， $X_1, X_2, X_3, \dots$  為獨立且相同分配之理賠金額。若理賠件數  $N$  的機率函數(probability mass function)  $f_N(n) = 0.2(0.8)^n, n = 0, 1, 2, \dots$ ，而理賠金額  $X_i$  的機率密度函數(probability density function)

$$f_X(x) = \frac{1}{500} e^{-x/500}, 0 < x < \infty,$$

下列何者為  $S_N$  的動差生成函數分  $M_{S_N}(t)$ ？

- (1)  $\frac{0.2 - 100t}{0.2 - 500t}$  (2)  $\frac{100}{100-t}$  (3)  $\frac{0.8}{0.2 - 400t}$  (4)  $\frac{0.8 - 400t}{0.2 - 400t}$

30 (4) 在五個不同地區，若一年發生芮氏規模四級以上地震之次數為獨立且相同的卜瓦松(Poisson)分配隨機變數，平均每年有 0.2 次。若從現在開始計時，在這五個地區之中，試問最早發生芮氏規模四級以上地震至少在 2 年之後的機率為何？

- (1)  $1 - e^{-0.4}$  (2)  $e^{-0.2}$  (3)  $e^{-0.4}$  (4)  $e^{-2}$

31(1) 令  $X$  和  $Y$  為連續的兩個隨機變數，其聯合機率密度函數如下：

$$f(x, y) = \begin{cases} 0.25, & 0 \leq x \leq 2, x - 2 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求  $E(X^3Y) = ?$

- (1)  $\frac{6}{5}$  (2)  $\frac{4}{3}$  (3) 2 (4) 4

32(2) 紿定下面訊息

- (1) 一保單組合的風險相互獨立，其風險可分為 A 和 B 兩類  
(2) A 風險保單數量是 B 風險的兩倍  
(3) 每一位被保險人在一個保單年度中，其理賠次數服從一個白努力分配(Bernoulli Distribution)  
(4) 一年的平均理賠次數：A 風險為 0.22 次，B 風險為 0.11 次  
求這一保單組合的平均理賠次數。  
(1) 0.19 (2) 0.1833 (3) 0.2431 (4) 0.1855

33(2) 從區間(0,1)中獨立隨機地抽出兩個數，求兩個數的差超過  $\frac{1}{2}$  的機率？

- (1)  $\frac{1}{8}$  (2)  $\frac{1}{4}$  (3)  $\frac{3}{8}$  (4)  $\frac{1}{2}$

34(2) 今有甲、乙、丙、丁、戊五名短跑選手，若此五名選手的實力相當，且彼此之短跑成績為獨立。若前一次賽跑之成績依序如下：甲、戊、乙、丁、丙，請問下一次短跑比賽成績排序為與前次完全相反，依序為：丙、丁、乙、戊、甲的機率為何？

- (1) 0 (2)  $\frac{1}{120}$  (3)  $\frac{1}{24}$  (4)  $\frac{1}{5}$

35(4) 若大型工程平均每 100 件有一件出險，假設出險件數服從卜瓦松(Poisson)機率分配，請問 10 件大型工程均無出險的機率為何？

- (1) 0.1 (2) 0.1732 (3) 0.7941 (4) 0.9048

36(4) 下列敘述何者正確？

- a. 若  $P(X > Y) = 1$ ，則  $E(X) > E(Y)$ 。  
b. 若  $E(X) > E(Y)$ ，則  $P(X > Y) > 0$ 。  
c. 若  $Y = X + 1$ ，則對所有的  $u$ ， $F_X(u) = F_Y(u + 1)$ 。  
(1) a, b (2) b, c (3) a, c (4) a, b, c

37(4) 兩個隨機變數  $(X, Y)$  的聯合機率密度函數如下：

$$f(x, y) = \begin{cases} 6(1-x-y) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x+y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求  $P(0 \leq X \leq \frac{1}{2}) = ?$

- (1)  $\frac{1}{12}$     (2)  $\frac{7}{12}$     (3)  $\frac{1}{4}$     (4)  $\frac{7}{8}$

38 (2)  $(X, Y)$  服從一個二維常態分配，

$$\mu_X = 3, \sigma_X^2 = 9, \mu_Y = 5, \sigma_Y^2 = 16, \text{Cov}(X, Y) = 0$$

求  $P(Y - X > 7) = ?$

- (1) 0.03    (2) 0.16    (3) 0.42    (4) 0.84

39 (2) 令隨機變數  $X$  的動差母函數(mgf)為

$$M(t) = \frac{\lambda}{\lambda-t}, t < \lambda$$

求  $E(X^2) = ?$

- (1)  $\frac{1}{\lambda}$     (2)  $\frac{2}{\lambda^2}$     (3)  $\frac{3}{\lambda^3}$     (4)  $\frac{1}{\lambda^2}$

40 (4) 令隨機變數  $X$  和  $Y$  相互獨立， $Var(X) = 1$ ， $Var(Y) = 2$ ，且  $Z = 3X - Y - 5$ ，求  $Var(Z) = ?$

- (1) 1    (2) 5    (3) 7    (4) 11